

## Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

### Bepanthen Plus 50 mg/g + 5 mg/g krema dekspantenol, klorheksidin

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4 dana.

#### Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Bepanthen Plus krema i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bepanthen Plus kremu?
3. Kako primjenjivati Bepanthen Plus kremu?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Bepanthen Plus kremu?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### 1. Što je Bepanthen Plus krema i za što se koristi?

Krema Bepanthen Plus primjenjuje se za sprječavanje infekcije i poticanje zacjeljivanja manjih površinskih rana i lezija kože kao što su:

- oguljotine, posjekotine, ogrebotine, ragade, opekotine, vrjedovi, dermatitis.
- kronične rane poput ulkusa na potkoljenicama i dekubitalnih ulkusa.
- rane nakon manjih kirurških zahvata.
- sekundarno inficirani ekcem i neurodermatitis.
- popucala koža bradavica u dojilja

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4 dana.

#### 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bepanthen Plus kremu?

##### Nemojte primjenjivati Bepanthen Plus kremu

- ako ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
- primjena na oštećenu opnu bubnjača

##### Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Bepanthen Plus kremu.

Primjena na velikim površinama kože mora se izbjegavati. Mora se izbjegavati dodir s očima, ušima i sluznicama.

Bepanthen Plus krema nije namijenjena za liječenje nadražene kože koja se najvjerojatnije neće inficirati (npr., opekotine od sunca). U takvim slučajevima potrebno je koristiti kremu koja sadrži samo dekspantenol.

Ako se Bepanthen Plus krema koristi za liječenje popucale kože bradavica u razdoblju dojenja, mora se ispratiti prije dojenja.

Ukoliko simptomi potraju ili se stanje pogorša, posavjetujte se s liječnikom.

Neophodno je potražiti savjet liječnika ako rana ostaje ista i ne pokazuje tendenciju zarastanja ili ako se rubovi rane intenzivno crvene, a oko rane se pojavi otok ili se javi povišena temperatura.

Ako dođe do pojave iritacije kože treba privremeno prekinuti primjenu kreme.

Česta lokalna primjena na istom mjestu može dovesti do nadražaja kože. Bepanthen Plus je namijenjen liječenju manjih oštećenja kože, stoga je potrebno izbjegavati prekomjernu uporabu.

### **Drugi lijekovi i Bepanthen Plus krema**

Krema Bepanthen Plus ne smije se koristiti istodobno s drugim antisepticima.

Klorheksidin nije kompatibilan s boratima, bikarbonatima, karbonatima, kloridima, citratima, fosfatima i sulfatima.

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako se Bepanthen Plus krema koristi za liječenje popucale kože bradavica u razdoblju dojenja, mora se ispratiti prije dojenja.

Primjena na velikim površinama kože mora se izbjegavati.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Nije primijećen utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.

### **Bepanthen Plus sadrži cetilni i stearilni alkohol i lanolin**

Cetilni i stearilni alkohol te lanolin mogu uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

## **3. Kako primjenjivati Bepanthen Plus kremu?**

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kremu Bepanthen Plus nanijeti na očišćenu ranu ili upaljena područja kože 1 – 2 puta dnevno, po potrebi i češće ako je tako odredio liječnik.

Tretirana područja kože mogu se ukoliko je potrebno, pokriti gazom.

### **Ako primijenite više Bepanthen Plus kreme nego što ste trebali**

Dekspantenol se dobro podnosi čak i u visokim dozama, pa se stoga u literaturi navodi da nije toksičan.

Nije poznat slučaj hipervitaminoze.

Opisano je povećanje aminotransferaze nakon otrovanja klorheksidinom.

### **Ako ste zaboravili primijeniti Bepanthen Plus kremu**

Ako ste zaboravili primijeniti kremu Bepanthen Plus, nastavite je primjenjivati u skladu s uputama.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

#### **4.      **Moguće nuspojave****

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prijavljene su alergijske kožne reakcije kao što su kontaktni dermatitis, alergijski dermatitis, svrbež, crvenilo, ekcem, osip, koprivnjača te preosjetljivost, anafilaktička reakcija i anafilaktički šok (potencijalno opasan po život).

#### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

#### **5.      **Kako čuvati Bepanthen Plus kremu?****

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.  
Čuvati na temperaturi do 25 °C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Rok valjanosti nakon prvog otvaranja je 12 mjeseci.

#### **6.      **Sadržaj pakiranja i druge informacije****

##### **Što Bepanthen Plus krema sadrži?**

Djelatne tvari su: 50 mg deks pantenola i 5 mg klorheksidindiklorida.

Pomoćne tvari su: vazelin, bijeli, parafin, tekući; lanolin (E 913); makrogolstearat; cetilni alkohol; stearylni alkohol; DL-pantolakton; voda, pročišćena.

##### **Kako Bepanthen Plus krema izgleda i sadržaj pakiranja?**

Bepanthen Plus krema je homogena, glatka emulzija, žućkaste boje bez mirisa.

Pakiranje: aluminijska tuba od 30 g kreme.

##### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

Nositelj odobrenja

Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

##### Proizvođač

GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell-Str. 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Njemačka

##### **Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i u specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

**Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2018.**